

Airone cenerino

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)



Sistematica

Ordine: Ciconiformi (Ciconiiformes)

Sottordine: Ardei (Ardeae)

Famiglia: Ardeidi (Ardeidae)

Sottofamiglia: Ardeini (Ardeinae)

Sottospecie italiana:

Ardea cinerea cinerea Linnaeus, 1766

Caratteristiche

Il corpo è lungo circa 1 m, con un'apertura alare che raggiunge i 2 m. La colorazione del piumaggio è grigiastra nelle parti superiori. La testa è bianca e presenta una calotta e lungo ciuffo neri. Le striature nere scendono anche lungo il collo sempre di colore biancastro. Il becco è di colore giallastro mentre le zampe sono brune. Rispetto all'airone rosso appare meno scuro. Entrambi i sessi si occupano dell'incubazione delle uova (3-5), di colore azzurro e verde pallido.

Habitat

Per alimentarsi frequenta una varietà di zone umide ad acqua bassa, sia dolce che salmastra, quali fiumi, torrenti, paludi, risaie, lagune e, di rado, le sponde marine. In inverno si alimenta anche in zone asciutte come i campi appena arati, ove cattura piccoli Mammiferi e Insetti. La dieta è composta da prede acquatiche diverse a seconda della disponibilità locale, in genere con prevalenza di Pesci, rane, Insetti e anche piccoli serpenti. Nidifica in zone planiziali, di preferenza in ambienti umidi con densa vegetazione arborea o arbustiva e in canneti. I nidi sono grosse piattaforme di rami intrecciati e sono posti a 10-30 m dal suolo. La nidificazione può avvenire con nidi isolati, ma di solito avviene in colonie, sia monospecifiche sia miste con altre specie di aironi e di uccelli acquatici.