

# Biacco

*Coluber viridiflavus* (Lacépède, 1789)



## Sistematica

**Ordine:** Squamata

**Sottordine:** Serpentes

**Famiglia:** Colubridae

## Caratteristiche

Lunghezza totale massima 200 cm, ma di rado oltre i 150 cm. Corpo slanciato, con capo ovoidale; caratterizzato da due squame preoculari, di cui l'inferiore molto più piccola; squame dorsali lisce. Colorazione variabile dal giallastro e ricoperto da macchie nerastre disposte a scacchiera, che caudalmente si fondono in strie longitudinali, al nero uniforme con macchie chiare nella regione labiale e golare e parti inferiori da giallo-bruno a grigio-nerastro. Giovani fino al terzo anno di età con dorso grigio-bruno chiaro debolmente macchiato di scuro e capo nerastro con esili strie e macchiette gialle.

L'accoppiamento ha luogo tra aprile e giugno; le uova (5-15) vengono deposte in luglio e, tra fine agosto e settembre schiudono.

Diurno, agile e veloce, prevalentemente terricolo; mordace e aggressivo se catturato. Caccia in prevalenza Sauri, ma anche piccoli Uccelli e Mammiferi; la preda viene afferrata e ingoiata ancora viva. E' in grado di predare serpenti, anche della sua stessa specie.

## Habitat

Predilige radure, margini di boschi, pietraie e zone rocciose; anche siepi, coltivi e aree antropizzate.