

# Falco di palude

## *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)



### Sistematica

**Ordine:** Falconiformi (Falconiformes)

**Sottordine:** Accipitri (Accipitres)

**Famiglia:** Accipitridi (Accipitridae)

**Sottospecie italiana:**

- *Circus aeruginosus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)

**Caratteristiche:** 48-45cm. Piumaggio variabile, il maschio si presenta castano scuro superiormente con coda grigio pallido sulle ali larghe le remiganti secondarie sono di colore grigio scuro in contrasto con le remiganti primarie nere. Testa fulva striata come la nuca ed il petto. Le parti inferiori sono brune. La femmina non presenta il grigio sulla coda, il piumaggio generale si presenta bruno scuro uniforme con testa e spalle color crema.

**Habitat:** La specie è tipica frequentatrice di zone umide estese ed aperte, con densa copertura di vegetazione emersa, come canneti, tifeti o altri strati erbacei alti. Preferisce acque lentiche, dolci o salmastre.

Si trova anche nei laghi, lungo fiumi dal corso lento, e in altri corpi idrici con acque aperte, purché circondate da canneti. Evita invece le aree forestate.

Nidifica dal livello del mare a 700 m. Il nido è posto sul terreno, spesso in zone parzialmente sommerse, e nascosto nella fitta vegetazione. Al di fuori del periodo riproduttivo, si trova anche in saline e campi di cereali situati vicino agli habitat più tipici, dove i falchi di palude si riuniscono al tramonto in dormitorio. In migrazione è stato osservato su montagne e foreste.