

Spatola

Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)



Sistematica

Ordine: Ciconiformi (Ciconiiformes)

Sottordine: Ciconi (Ciconiae)

Famiglia: Threskiornitidi (Threskiornithidae)

Sottofamiglia: Plataleini (Plataleinae)

Sottospecie italiana:

- *Platalea leucorodia leucorodia* Linnaeus, 1758

Caratteristiche

Facilmente riconoscibile per il piumaggio bianco niveo e per il lungo becco a forma di spatola. Gli adulti hanno la base del collo color ocra e, in estate, presentano un ciuffo erettile sulla nuca. Presenta zampe nere mentre il becco è nero ma presenta la punta gialla. Gli immaturi presentano la punta delle ali nera e mancano della tinta ocra sul collo.

Il becco è grigio rosa e le zampe giallo grigiastre. Si distinguono involo da tutti gli aironi perchè hanno il collo teso.

Habitat

L'alimentazione avviene in ambienti ad acqua bassa e ferma, sia dolce che salata, quali paludi, laghi, lagune. Sono catturate varie prede: Insetti e loro larve, piccoli Pesci, Crostacei, vermi e altri piccoli animali acquatici.

La cattura avviene muovendo la punta del becco, dalla particolare conformazione a spatola, nell'acqua presso il fondo.

Viene così creata una corrente d'acqua e vengono portate in sospensione le prede, che sono afferrate quando passano tra i due rami del becco. Nidifica in zone planiziali.

I nidi possono essere posti a terra su isolotti lagunari, ma anche su alberi, cespugli o canne. Il nido è costituito da rametti intrecciati. La nidificazione avviene in colonie, sia monospecifiche sia miste con altre specie di uccelli acquatici.